

AKUTGUIDE NYFÖDD KALV – mjölk


1. JOBBA SÄKERT

- Är det lugnt i boxen, går det att gå in?
- Kan du snabbt komma ut om det behövs?
- Lås fast eller flytta kon samt andra lösgående djur innan du hanterar kalven.

Var försiktig!

2. KOLLA ANDNINGEN

- Rensa nos och mun från hinnor och slem.
- Stimulera andningen genom att;
 - Peta med ett halmstrå på nosens mellanvägg eller nyp i den.
 - Om inte det räcker, skvätt lite kallt vatten i örat.
 - Lägg kalven i **återhämtningssläge**.
 - Gnugga över bröstet med halm eller handduk.



ÅTERHÄMTNINGSLÄGE

Brösläge med frambenen vikta och bakbenen framsträckta riktade mot öronen.

3. TORKA OCH VÄRM

- Torka kalven torr och ren.
- Lägg den på torrt, rent och mjukt underlag, gärna halm.
- Kontrollera kroppstemperaturen.

Om kalven är nerkyld:

- Värm den först, ge inte råmjölk än.
- Lägg kalven under värmelampa.
- Kontrollera temperaturen regelbundet. Det kan ta upp till 1 timme att värma upp en kalv till 39 °C.
- Rådgör med veterinär om kalven inte svarar på uppvärmningsförsöket.

Kroppstemperatur

- Normal: cirka 39 °C
- Nerkyld: under 37,8 °C
- Feber: över 40 °C

4. KOLLA SUGREFLEX

- Stick in ett finger i munnen och testa sugreflexen.
- Om sugreflexen är svag se till att kalven får råmjölk omgående. Du kan behöva sonda.

Sugreflex

Den ska vara tydlig och stark. Svag reflex ökar risken att kalven inte ska få i sig råmjölk i tid.

5. GE RÅMJÖLK

Erbjud alla kalvar råmjölk.

- Värm råmjölken till 40 grader och ge kalven.
- Sonda om kalven är svag och inte orkar dricka. Vid sondning ska kalven stå eller ligga på bröstet.

Kalven behöver:

- 4 liter råmjölk, inom 1 timme efter kalvningen.
- 2 till 3 liter till, inom 6 timmar.
- 4 liter till, inom 12 timmar.

Antikroppar

Mät brix: Över 22 är bra. Vid sämre värden blir mål 2 och 3 extra viktiga.

6. FORTSÄTT HA KOLL

Följ upp kalven ofta:

- ✓ Ligger den på bröstet?
- ✓ Kan den stå?
- ✓ Äter den?
- ✓ Har den kissat och bajsat?
- ✓ Kolla tempen. Är den nerkyld eller har den feber?

- Om kalven har feber, är slö eller om något avviker – rådgör med veterinär.
- Anteckna vad kalven varit med om.

Bra att veta

Kalven lägger sig oftast i brösläge inom 5 minuter och reser sig inom en timme efter kalvning.