

KOMPASS: GRIS

Utfodring av digivande suggor



Planering inför grisning

Använd övergångsfoder från insättning i grisningsstallet till två till tre dagar efter grisning. Övergångsfoder ska ha lägre proteinhalt och högre fiberinnehåll.



Fodrets innehåll

	Övergångsfoder		Digivningsfoder	
	*Sis-lysing/kg	MJ NE/kg	*Sis-lysing/kg	MJ NE/kg
Topigs Norsvin	6,3–6,6	9,3–9,7	9,0–9,3	9,7–10,0
DanBred	8,2–8,7	9,9–10,5	8,2–8,7	9,9–10,5



Utfodringsrutiner

- Ge foder tre gånger per dag med jämna mellanrum.
- Justera fodergiva endast om suggan äter upp allt.



Foderkurvor

- Anpassa kurvor efter gyltor och äldre suggor.
- Vid torrfoder: anpassa mängd till automatens kapacitet.
- Vid blötfoder: använd minimikurva, justeras i styrsystemet.



Äter suggan inte upp sitt foder? Kontrollera fodergiva samt saggans hälsoläge. Saggan ska äta upp sin giva under grisningen samt första veckan efter grisning. Från dag 8 till avvänjning bör det finnas foder kvar vid nästa utfodring.



Fodertilldelningsexempel

- DanBred: från 2,9 kg dag 0 till 9 kg dag 18–35.
- Topigs Norsvin: från 2,5 kg dag 0 till fri tilldelning (ad lib) efter dag 8.



Maximala givor

- Förstagrisare: minst 8 kg/dag.
- Saggor i normalt hull: cirka 9 kg/dag.
- Magra saggor: upp till 10,5 kg.



Övrigt

- Håll koll på hull och aptit – särskilt viktigt från dag 16.
- Viktförlust på 6–7 procent (cirka 20 kg) är normalt och acceptabelt.

Läs mer i dessa rapporter på lantbruketskunskapsbank.se:

- Utfodring av digivande saggor: övergångs- och digivningsfoder.
- Utfodring av digivande saggor: utfodringsrutiner, kurvor och givor.