

Bogsår hos suggor – så gör du



Vad är bogsår?

Bogsår liknar liggsår hos människor och uppstår av långvarigt tryck, särskilt där bogbenet ligger nära hudytan. Magra suggor saknar skyddande späcklager och löper högre risk.



Förebyggande åtgärder

De flesta bogsår uppstår under de första veckorna efter grisning, då suggan tillbringar mycket tid liggandes på sidan. Därför är rätt hull och minskad liggtid viktiga faktorer direkt efter inflyttning i grisningsavdelningen. Sikta på ryggspäckmått på 14–16 millimeter för kull 1–2 och 13–15 millimeter från kull 3.



Suggor med tidigare bogsår

En sugga som haft bogsår har dubbelt så hög risk att drabbas igen. Notera detta tydligt i journalen. Suggor som tidigare haft bogsår ska vid ny grisning få axelväst, tejp, extra halm eller gummimatta redan vid insättning, även om såret är helt läkt.



Daglig kontroll

Inspektera bogarna dagligen, gärna vid utfodring. Leta efter rodnad vilket är ett tidigt tecken på sår.



Till vänster: Sugga med lindrigt bogsår.

Till höger: Tejpning av bogen kan bidra till att förebygga sår, men skyddar inte mot tryckskador. Komplettera alltid med axelväst, halmbädd eller gummimatta för fullt skydd.



Liggmiljö och rörelse

Suggor ska kunna resa och lägga sig utan svårighet. Utfodra minst tre gånger dagligen för att stimulera rörelse. Utöver det bör suggan uppmuntras att resa sig minst fem till åtta gånger per dag. Golvet ska vara torrt, fast och plant. Ojämna eller fuktiga ytor ökar risken för sår. Känn med knogarna, känns ytan ojämn är skaderisken större.



Transport

Suggor med svåra bogsår får inte transporteras. Endast läkta eller ärrade sår godkänns, under särskilda villkor.

Behandling av bogsår

- **Vid rodnad: Axelväst, tejp, extra halm eller gummimatta.**
- **Mindre sår: Följ veterinärens anvisningar.**
- **Svåra sår (≥5 cm): Flytta suggan till sjukbox och behandla efter veterinärens anvisningar. Hjälper inte detta, ska suggan avlivas.**