

KOMPASS:
GRIS

Förlossningshjälp – så gör du

**När ska du hjälpa till?**

Förlossningshjälp ska endast ges vid tydliga tecken på komplikationer. Ingrepp som sker i onödan kan orsaka skador, infektioner och stress för suggan. En god bedömning och hygien är avgörande för att undvika negativa följder.

Är du osäker – ring och rådfråga veterinär.

**Så gör du vid förlossningshjälp:****Vid framfödsel:**

- Greppa grisen om nacken eller, om det inte går, underkäken.
- I sista hand: greppa båda frambenen ovanför knälederna (ett ben mellan pek-/långfinger, ett mellan lång-/ringfinger).

Vid bakfödsel:

- Greppa bakbenen ovanför hasen, med samma fingersättning.

Utdragning:

- Dra med jämnt, kontrollerat tryck, synkroniserat med suggans värkar.



Till vänster: 1. Avföring, navelsträng och fosterhinnor är tecken på att det finns grisar kvar i suggan.
Till höger: 2. Greppa grisen om nacken.



Till vänster: 3. Dra med jämnt och kontrollerat tryck, synkroniserat med suggans värkar.
Till höger: 4. Placera grisen direkt i värmebox om suggan står upp.



Efter utdragning:

- Håll grisen i bakbenen och svinga den försiktigt fram och tillbaka för att rensa luftvägarna.
- Placera grisen i värmebox om suggan står upp – då minskar risken att hon lägger sig på den.
- Om suggan ligger ner, lägg grisen vid juvret och se till att den får tillgång till spene för att komma igång och dia.



Efter förlossningshjälp:

- Hjälpn är klar först när alla grisar som kan nås har dragits ut.
- Värkar kan avstanna i upp till en timme efter ingrepp – kontrollera suggan igen efter 30–60 min.
- Suggor som fått hjälp löper högre risk för livmoderinflammation – håll extra koll på allmän-tillstånd och aptit efteråt.

Läs mer i kompass DI 7a "Förlossningshjälp – när den är nödvändig" samt kompass DI 7c "Förlossningshjälp – komplicerade förlopp".