

KOMPASS:
GRIS

Förlossningshjälp – komplicerade förlopp

**När ska du hjälpa till?**

Förlossningshjälp ska endast ges vid tydliga tecken på komplikationer. Ingrepp som sker i onödan kan orsaka skador, infektioner och stress för suggan. En god bedömning och hygien är avgörande för att undvika negativa följder.

Är du osäker – ring och rådfråga veterinär.

**Vid komplicerade förlopp:****1. Inga värkar:**

- Ge förlossningshjälp.
- Dra ut de grisar som nås.
- Kontrollera suggan igen efter 30 minuter. Om suggan efter 30 minuter fortfarande inte har värkar – rådgör med veterinär.

**2. Blockerad födelsekanal:**

- Ge hjälp.
- Dra ut så många grisar som möjligt.
- Låt suggan vila i en timme, kontrollera sedan igen.



Till vänster: Avföring, navelsträng och fosterhinnor är tecken på att det finns grisar kvar i suggan.

Till höger: I första hand – dra ut så många grisar som du når.



3. Felläge:

- Skjut försiktigt in grisen en bit.
- Justera läget och dra ut genom grepp om huvud eller bakben.



Förlossningsslinga

Vid svårt grepp bör en förlossningsslinga (rent verktyg) användas. Tråden leds bakom grisens huvud, runt underkäken eller runt bakbenen för att möjliggöra utdragning.



Observera!

Onödig förlossningshjälp kan skada suggan. Är du minsta osäker bör du kontakta veterinär. God hygien minskar risken för livmoderinflammation, nedsatt mjölkproduktion och fertilitetsproblem.

Läs mer i kompass DI 7a "Förlossningshjälp – när den är nödvändig" samt kompass DI 7b "Förlossningshjälp – så gör du".