



Stödmatning av råmjölk



Livsviktig råmjölk

Råmjölk är livsviktig för smågrisarnas överlevnad, tillväxt och immunförsvar. Den innehåller antikroppar som skyddar mot infektioner under grisens första levnadsveckor. För att ge alla smågrisar bästa möjliga start är det avgörande att de får i sig tillräckligt med råmjölk under de första levnadstimmarna.



Ge mjölk från annan sugga

Om suggan inte producerar tillräckligt med råmjölk kan man ge frusen eller tinad råmjölk från en annan sugga, alternativt använda en kommersiellt tillverkad kolostrumersättning för smågrisar.



Olika sätt att mata

Stödmatning kan göras på olika sätt beroende på grisarnas behov och ålder. En vanlig metod är att använda en 20 ml-spruta och ge mjölkersättning anpassad för smågrisar direkt i munnen. Det passar bäst för enstaka smågrisar.



Till vänster: Skålarna för mjölkersättning hålls rena och byts ut regelbundet för att undvika bakterietillväxt.

Till höger: Se till att alla grisar diar inom 1–2 timmar efter födseln.



Sondmatning

Mycket svaga smågrisar kan behöva sondmatas. Denna metod kräver vana och stor försiktighet eftersom det finns risk att mjölken hamnar i luftvägarna. Därför bör sondmatning endast utföras av erfaren personal eller veterinär.



Erbjud mjölkersättning

När grisarna blivit några dagar gamla och orkar dricka själva kan man erbjuda mjölkersättning i en låg skål eller ett tråg. Det är viktigt att behållarna hålls rena och att mjölken byts ut regelbundet för att undvika bakterietillväxt.

Att tänka på!

Mjölken bör värmas till kroppstemperatur, cirka 38–40 °C, och grisarna matas med små mängder ofta, exempelvis varannan till var fjärde timme.