

Minskad viktspridning hos tillväxtgrisarna



Eftersträva jämnstora grisar

Ett bra sätt att förebygga viktspridning bland tillväxtgrisarna är att de är så jämnstora som möjligt redan vid insättning och att grisarna får bästa möjliga förutsättningar för att komma i gång att äta och växa redan från start.



Erbjud rätt foder

Grisen ska erbjudas ett foder som är anpassat till grisens ålder och vikt. Under avvänjningsperioden, som pågår i cirka två veckor, bör grisen få ett foder med lägre råproteinhalt som är snällare mot magen. Detta introduceras redan i grisningsavdelningen. Därefter tilldelas ett tillväxtfoder som är smakligt, med lättsmälta råvaror och högt energi- och aminosyrainnehåll.



Skonsam övergång av foder

Fodret kan gärna vara berikat med syror för att minska tillväxten av skadliga tarmbakterier. Efter 25 kilo kan övergången ske till ett foder som är mer snarligt fas 1-fodret i slaktgrisledet, för en mjuk och skonsam övergång.



Beräkna ätytan

Det ska finnas tillräckligt med ätyta vid tråget så att alla grisar har möjlighet att äta samtidigt. Enligt Jordbruksverkets föreskrifter beräknas ätutrymmet (meter) vid tråget per växande gris, 10 – 130 kg, med hjälp av formeln:

$$0,164 + (\text{vikt i kg}) / 538$$



Till vänster: Alla grisar ska få plats att äta vid tråget samtidigt.
Till höger: Box med ojämna tillväxtgrisar.

Kontrollera följande punkter inför insättningen i tillväxtavdelningen:

- Rätt temperatur i avdelningen. Rekommenderat är 24 °C där grisen vistas.
- Överväg kullvis förflyttning för att minimera stress.
- Säkerställ att grisarna kommit i gång med att äta smågrisfoder under digivningen så att de är förberedda inför flytten till tillväxtavdelningen. Detta främjar bättre tillväxt efter avvänjning.
- Att grisen erbjuds foder i tillväxtavdelningen som den är van vid från tiden i grisningsavdelningen, för igenkänning av fodret och för att undvika störningar som diarréer.
- Rätt flöde i vattennippeln. För tillväxtgrisar 10–30 kg är rekommendationen en till tre liter per minut. Säkerhetsställ att alla grisar når upp till nippeln.
- Möjlighet att sortera ut eftersatta grisar senare i tillväxtperioden. Detta för att ge alla grisar bästa förutsättningar för tillväxt.
- Följa upp foderjusteringar och kontrollera foderkurvor dagligen och gärna av samma person.
- Det ska finnas tillgång till sjukbox så att sjuka grisar snabbt kan tas om hand och behandlas.
- Kom ihåg! De vanligaste orsakerna till att viktspridning uppkommer under tiden i tillväxtavdelningen är: Ohälsa, för litet ätutrymme samt bristande och inkonsekventa dagliga rutiner.