

Omgruppera ojämna tillväxtgrisar



Till vänster: Alla grisar ska få plats att äta vid tråget samtidigt.
Till höger: Ojämna tillväxtgrisar.

Foto: Sandra Kylbrant



Vikten av en jämn gruppstorlek

För att uppnå en önskad tillväxt hos dina tillväxtgrisar är det viktigt med en jämn gruppstorlek. Här presenteras några åtgärder som du kan genomföra för att få en jämnare tillväxt och för att identifiera orsaken till ojämna grisar.



Svaga och sjuka grisar

Grisar som är i behov av särskild vård ska förflyttas till en sjukbox för behandling. Omgruppering skapar alltid en oro bland grisarna när en ny social rangordning ska upprättas. Därför är det viktigt att omgrupperingen görs så skonsamt som möjligt och att det säkerställs att grisarna har en bra miljö i boxen de kommer till. Ge gärna extra strömaterial som grisarna kan sysselsätta sig med.



Tillräckligt med ätutrymme

Försäkra dig att grisarna har tillräckligt med ätutrymme för att kunna äta i en lugn miljö utan onödig stress efter förflyttningen. Om det finns begränsningar för foder, vatten och ätutrymme kan det innebära att konkurrens uppstår i gruppen. Efter flytt är det viktigt att följa upp att en ny stabil rangordning snabbt bildas och bibehålls. En stabil rangordning är förutsättningen för god trivsel, bra hälsotillstånd och effektiv produktion.



Orsaker till ojämna grisar

För att motverka framtida problem med ojämna grisar är det viktigt att få klart för sig varför problemet inträffade. Tänk tillbaka i samtliga led, inte bara tiden i tillväxtstallet.



Kullar – ojämna födelsevikt:

- Följ upp suggornas åldersfördelning och deras historik med till exempel grisningsförlopp med hjälp av suggkortet.
- Följ upp eventuella stressfaktorer för suggorna i slutet av dräktigheten samt inför och under grisningen.



Ytterligare omgruppering

Om du noterar att grisarna i en grupp eller box blir ojämna i storlek är det viktigt att i ett tidigt skede åtgärda detta. De grisar som halkat efter i vikt bör placeras i boxar tillsammans med grisar i ungefär samma storlek för att få optimala förutsättningar för bland annat utfodring.

Kullar – ojämna avvänjningsvikt:

- Kolla upp suggornas juverstandard.
- Följ upp kullutjämningsrutiner samt eventuella amsuggerutiner.
- Följ upp grisarnas konsumtion av smågrisfoder under digivningen.

Reflektioner om avvänjningsperioden:

- **Foderstrategi under avvänjningen och flytten:** erbjöds grisarna samma foder som de var vana att äta under slutet av digivningsperioden?
- **Boxens komfort efter flytt till tillväxtboxen:** Kom de nyavvanda grisarna till en välkomnande miljö med torra golv, tillräckligt med strö och en temperatur på 24 °C?
- **Ojämna grisar efter flytt till tillväxtboxen:** När började det märkas en spridning i storlek bland grisarna?