


## HITTA DEN SJUKA KALVEN TIDIGT

Titta efter små förändringar:

- Äter mindre och långsammare, lämnar mjölk.
- Lös i magen.
- Ändrad kroppshållning, hängande öron.
- Mindre uppmärksam.
- Blir liggandes eller ståendes längre perioder.

# OMSORGSGUIDE SJUK KALV



Om kalven har fler eller allvarliga symtom – rådgör med veterinär.

Överväg avlivning direkt om:

- Prognosen är dålig (till exempel allvarlig skada, kramper eller medvetslöshet).
- Det inte finns tid att ta hand om kalven.

### Kroppstemperatur:

- Normal: ca 39 °C
- Feber: över 40 °C
- Nerkyld: under 37,8 °C

## UNDERSÖK DIREKT

Kolla:

- Kroppstemperatur, sugreflex, andning, träck, navel, hälta, andra avvikelser.
- Om fler kalvar har symtom.

Flytta till sjukbox för extra omvårdnad, lugn och ro, eller om kalven kan smitta andra.

I lindriga fall kan kalven gå kvar i gruppen – märk den med färg och följ upp ofta.

Räcker det att du tar hand om kalven själv eller behöver du kontakta veterinär?

Anteckna vad kalven varit med om och gör en plan för vem som följer upp och när.

## TA HAND OM KALVEN

- Lägg svaga kalvar i återhämtningssläge.
- Ge extra värme via täcke eller värmelampa, om du behöver en tjock tröja.
- Se till att det är nära till mat och vatten samt torrt, rent och dragfritt.

- Ge mjölken i flera mindre givor, 2 liter per gång. Hjälプ kalven att äta.
- Behandla enligt veterinärens anvisningar.
- Ge fri tillgång till ljummet vatten.

### Saltbalans

Bra till alla kalvar men viktigast till de med diarré eller feber.

- Ges ljummen med cirka 2 timmar mellan mjölk och saltbalans.

Alla sjuka kalvar:

- Ge 2 liter, en eller flera gånger per dag.
- Vid diarré:
- Ge minst 2 liter 2–3 gånger per dag.

### Kolla vätskebehovet

Insjunkna ögon och/eller kvarstående hudveck på halsen = kalven behöver vätska.

- Stående kalv med normal sugreflex – kan dricka själv eller sondas.
- Stående kalv med nedsatt sugreflex – sondas.
- Liggande, svag kalv med nedsatt sugreflex – behöver vätska via dropp.

## FÖLJ UPP KALVEN

Kolla:

- Kroppstemperatur, sugreflex, andning, träck, navel, hälta, andra avvikelser.
- Om fler kalvar har symtom.

- Om kalven är frisk – vänta minst ett dygn innan kalven flyttas tillbaka.
- Om kalven blir bättre – fortsatt med extra omvårdnad.
- Om kalven inte blir bättre eller försämras – rådgör med veterinär.

Överväg avlivning om kalven:

- Inte dricker eller äter själv.
  - Inte blir bättre eller om den blir sämre.
  - Blir sjuk igen.
  - Prognosen är dålig.
- Rådgör gärna med veterinär.