

Utfodring av smågrisar i grisningsstallet



Foderkvalitet och näringsbehov

Smågrisarnas behov av näring ska i huvudsak täckas av suggans mjölk fram till avvänjning. Smågrisfodret ska vara anpassat efter näringsnormer för diande grisar och ha hög smaklighet för att stimulera foderintaget.



Tidig introduktion till foder

Introducera smågrisfoder, som komplement till suggans mjölk, från cirka sju dagars ålder. Utfodringen sker två till fem gånger dagligen. Börja på det fasta golvet och gå eventuellt över till tråg/automat när grisarna blivit vana. Från tre veckors ålder anpassas fodermängden dagligen efter grisarnas aptit och konsumtion. Exempel: Foderintaget hos kullar med 24 dagar gamla grisar kan variera kraftigt – från 100 gram till 1 kilo torrfoder per dag. Anpassa mängden utifrån faktisk konsumtion. **Tips!** Placera det första fodret där även suggan kan nå det då hennes intresse kan stimulera grisarnas nyfikenhet och aptit.



Hygien och trågrutiner

- Rengör tråget minst en gång dagligen.
- Allt foder bör vara uppätet före nästa utfodring. Gammalt foder tappar smak och attraktivitet.
- Mjolkprodukter får stå framme högst sex timmar och elektrolyter högst 30 minuter.
- Blandningsutrustning ska rengöras efter varje användning.
- Mjölkanläggningar ska desinficeras en till två gånger i veckan och mjölkkoppar rengörs fyra till sju gånger i veckan.

Foto: Vallberga Lantmän



Till vänster: Mjölkanläggningar ska desinficeras en till två gånger i veckan och mjölkkoppar rengörs fyra till sju gånger i veckan. Till höger: Foderhygien är mycket viktig. Tråget och underlaget ska alltid vara rent och torrt inför varje utfodring.



Utfodring av sjuka eller underutvecklade grisar

Vid sjukdom eller när suggans mjölkproduktion inte räcker till, kan tilläggsfoder behövas:

a) Elektrolyter

- Återställer vätskebalans och tillför energi och mineraler.
- Blandningen bör konsumeras inom 30 minuter.

b) Mjolkprodukter och ersättning

- Energiboosters kan ges till svagfödda grisar kort efter födseln, men ersätter inte suggans råmjölk.
- Mjölkersättning kan användas till kullar där suggan inte producerar tillräckligt med mjölk.
- Blandas enligt instruktioner, korrekt temperatur och noggrann omrörning är viktigt.

c) Syrade mjolkprodukter

- Förebygger diarré genom tillförsel av mjölksyrabakterier.
- Särskilt användbart i svaga kullar eller när suggan är sjuk.



En god start i grislivet

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa att smågrisarna får en god start, minskar risken för avvänjningsdiarré och stärker förutsättningarna för ett bra foderintag efter avvänjning.

Läs mer i rapporten:

”Utfodring av smågrisar i grisningsstallet” på lantbruketskunskapsbank.se.