

Efter grisning – flytta alla grisar till juvret för intag av den viktiga råmjölken.

Övervakning efter grisning



En stark start

Fokus efter grisning ska ligga på tre saker: smågrisarnas välmående och suggans foderintag samt vattentillgång. Dessa faktorer är avgörande för en stark start för smågrisarna.



Smågrisarnas välmående

- Kontrollera att alla smågrisar är torra, varma och pigga.
- Säkerställ att varje smågris får råmjölk: intaget de första sex till åtta timmarna efter födseln är avgörande.
- Utför kullutjämning för att ge alla smågrisar optimala förutsättningar. Påbörja kullutjämning först när alla kultingar ätit råmjölk, efter avslutad grisning.



Säkra saggans vattentillgång för mjölkproduktionen.



Saggans foderintag och vattentillgång

Saggans foderintag och vattentillgång är avgörande för en bra mjölkproduktion.

- Saggor ska äta upp hela sin fodergiva inom 30 minuter.
- Justera fodergivan dagligen – små ökningar varje dag under första veckan. Se exempelkurvor för fodertilldelning: Utfodring av digivande saggor: utfodringsrutiner, kurvor och givor | Kunskapsbanken
- Utfodra 3–4 gånger per dag och töm foderträgen före varje mål.
- Säkra god vattentillgång; detta är avgörande för mjölkproduktionen.

Läs mer:

- **DI9 – Kullutjämning**
- **DI11a – Grisningsförberedelser för en bra start**
- **SM2a – Tillgång till råmjölk för alla grisar**