


Tidpunkt för brunstpassning och seminering

Till vänster: Galtkontakt för ståbrunst.
Till höger: Illustration: Camilla Hallgren.

När ska man seminera? - Brunstkontroll 1 gång dagligen



>> Hur det fungerar i praktiken

Syftet med brunstpassning är att se när ståbrunsten (högbrunsten) börjar. Ägglossningen sker sedan 2/3 in i ståbrunsten och då vill vi att sperman finns på plats. Så länge suggan visar tydlig ståbrunst semineras hon. I praktiken görs första brunstkontroll/seminering tre till fyra dagar efter avvänjning. Om till exempel avvänjning sker en torsdag så semineras suggan oftast första gången på måndagen därefter.

>> Brunstpassning en gång per dag

Det vanligaste idag är att brunstpassning/seminering görs en gång per dag och då semineras vi oftast när vi ser första ståbrunst. Eftersom sperman överlever i suggan under 24 timmar gäller det att ny sperma finns på plats innan föregående semineringsdos är förbrukad. Därför är det klokt att det går cirka 17–18 timmar mellan semineringsstillfällena. Se exempel i bilden till höger.

>> Brunstpassning två gånger om dagen

Gör man brunstpassning två gånger per dag kan djur som visar ståbrunst för första gången märkas till exempel på morgonen, för att sedan semineras vid nästföljande tillfälle på eftermiddagen.

>> Seminering av djur med kortare brunst

Suggor som visar brunst sent efter avvänjning, på sjätte dagen eller senare, har ofta en kortare brunst och bör semineras direkt när första ståbrunst ses. Samma sak gäller för gyltor, som också har en kortare brunst än äldre suggor.

>> Undantag och hantering av dessa djur

Hos suggor som hålls i grupp under digivningen, suggor som avvänjer få smågrisar eller hos amsuggor finns det alltid en ökad risk för brunst under digivningen. Dessa bör märkas upp i samband med avvänjningen för extra uppsikt redan från avvänjningsdagen, då de kan brunsta både tidigare och senare än övriga gruppen.