

Utfodring av sinsuggor – rekommenderade givor



Till vänster: Halm delas ut som sysselsättning och grovfoder.
Till höger: Gyltor i bra hull.



Rekommendationer Topigs Norsvin

Riktlinjer för utfodringsgiva till dräktiga suggor i normalhull med ett foder som innehåller 9,5 MJ NE/kg samt 0,53 gram sis lysin/MJ NE. Kg foder per dag (MJ NE per dag), dagar efter seminering:

Kull-nummer	Dag 0–30	Dag 31–84	Dag 85–inflytt BB
1	2,25 kg (21,4 MJ)	2,45 kg (23,3 MJ)	2,9 kg (27,6 MJ)
2–3	2,85 kg (27,6 MJ)	2,55 kg (24,0 MJ)	3,0 kg (28,5 MJ)
≥4	2,95 kg (28,0 MJ)	2,65 kg (25,2 MJ)	3,1 kg (29,5 MJ)

Kullnummer ≥4 kan med fördel ges ett foder med lägre förhållande mellan aminosyror och energi för att gynna fettansättning i stället för muskeltillväxt.



Rekommendationer Danbred

Riktlinjer för utfodringsgiva (kg per dag) med ett foder som innehåller 9,5 MJ NE samt 0,43 gram sis lysin/MJ NE, efter hull och dagar efter seminering:

Dagar efter seminering	Tunn <12 mm	Medel 12–14 mm	Fet >14 mm	Gyltor
1–28	4,3	2,9	2,4	2,2–2,4
29–84	4,3	2,3	2,3	2,4–2,6
85–110	3,9	3,4	3,4	3,3
111–117	3,7	3,7	3,7	3,7

En tunn sugga ska flyttas över till normalkurva så snart hullet är återställt, annars finns en risk att hon blir fet.

Vill du veta mer?

Läs mer i kompass DR2a – Utfodring och näringsbehov hos sinsuggor, och DR2c – Utfodring av sinsuggor – tänk på!