

Dräktighetsundersökning

Till vänster: Dräktighetsundersökning med ultraljud.
Till höger: Använd gel anpassad för sonden.

» Dräktighetsundersökning

De dagar som suggan inte är dräktig eller digivande (improduktiva dagar/tomdagar) är kostsamma. Genom att kontrollera att suggorna är dräktiga kan tomdagar minimeras. Dräktighetsundersökning kan göras från dag 28 i dräktigheten. Undersökningen kan ske med olika mätinstrument men oavsett sätts sonden i suggans ljumske.

» Undersökning med ultraljud

- Lättast att utläsa resultat på ultraljudsbilden vid fyra veckor efter betäckning. Ultraljud kan användas ända fram till grisning.
- Rekommendationen är att dräktighetsundersöka suggorna två gånger; först vid fyra veckors dräktighet och sedan vid sju till åtta veckors dräktighet.
- Vid dräktighet syns svarta fosterblåsor på en gråvit bakgrund (fyra veckor efter betäckning). Fostrens skelett börjar bildas vid cirka 30 dagars dräktighet och kan urskiljas vid den senare undersökningen.
- Ej dräktig – gråvit bild på mätinstrumentets skärm.

» Undersökning med ljudvågor, t.ex. Preg-Tone

Mätinstrumentet ger ifrån sig en ihållande ton när den stöter på fostervätska. Tänk på att den även kan ge utslag vid urinblåsan och därför får sonden inte placeras för långt bak. En Preg-Tone kan användas mellan dag 30–50 i dräktigheten.

» Hur fungerar undersökningen praktiskt?

- Dräktighetsundersökningen kan med fördel göras i suggornas ätbås eller seminbås.
- Ge suggorna torrfoder på golvet en bit in i båset för att lättare komma åt.
- Markera tomma suggor med till exempel ett minus-tecken på ryggen och registrera som ej dräktig i uppföljningsprogram eller betäckningslista.
- Använd gel anpassad för apparaten. Sondens är ömtålig – undvik att ”slå” den i inredningen. Framkommer inte bild på ena sidan testas sonden på andra sidan.