

**KOMPASS:**  
GRIS

# Styrning av brunsten hos gyltan

## – naturlig synkronisering



### Naturlig brunstsynkronisering

För att synkronisera brunsten hos en grupp gyltor inför betäckning/seminering kan de utsättas för "positiv stress". I praktiken innebär detta att gyltorna flyttas, eventuellt grupperas om och ges galtkontakt. För att gyltorna ska kunna få en så kallad flyttbrunst måste de vara minst 12 dagar in i sin brunstcykel, därför är det bra att ha koll på sina växande gyltämnen och skriva upp när de börjar brunsta. Normal brunstcykel är 19–23 dagar.



### Exempel: synkronisering inför vecka 6

För att synka brunsten kan du välja mellan två tidpunkter för flytt och omgruppering:

- Alternativ 1: i slutet av vecka 1 (cirka 3,5 veckor innan planerad betäckning/seminering).
- Alternativ 2: i början av vecka 5 (3–5 dagar innan planerad betäckning/seminering).

Vid båda alternativen ska gyltorna byta miljö, eventuellt omgrupperas och få kontakt med galt.



### Vad händer efter flytt?

Om flyttbrunst utlöses kommer gyltorna i brunst cirka 3–5 dagar efter flytten. Då kan de betäckas direkt vid denna brunst, eller så väljer du att betäcka dem vid nästa brunst, vilket infaller ungefär tre veckor senare.